予防接種について



上富田町保健センター
電話　　４７－５３００

予防接種をすることで免疫をつくることができ、病気を予防したり、症状を軽くしたりすることができます。
適切な時期に予防接種を行い、お子さんと周囲の人の健康を守りましょう。

予防接種一覧表

	開始年齢	予防接種の種類	接種回数	標準的な接種期間	ワクチンの種類	通知方法
定期接種	生後2ヵ月	○小児肺炎球菌（※1）	計4回			
		初回	3回 （27日以上の間隔をあける）	生後2ヵ月～7ヵ月未満 （生後12ヵ月未満まで）	不活化ワクチン	訪問
		追加	1回 （3回目の接種後60日以上の間隔をあけて）	生後12ヵ月に至った日以降から （生後12ヵ月～15ヵ月の間）		
		○ヒブ（※1）	計4回			
		初回	3回 （27日以上の間隔をあけて）	生後2ヵ月～7ヵ月未満 （生後12ヵ月齢未満まで）	不活化ワクチン	訪問
		追加	1回 （3回目の接種後7～13ヵ月の間隔内で）	生後60ヵ月未満まで		
		○B型肝炎	計3回			
			27日以上の間隔で2回接種後、1回目から139日以上の間隔をおいて1回	生後2ヵ月～1歳未満	不活化ワクチン	訪問
		○ロタウイルス（※2）	計2～3回			
		ロタリックス（1価）	2回	生後6週～24週 初回接種は生後14週6日までに行う	生ワクチン	訪問
		ロタテック（5価）	3回	生後6週～32週 初回接種は生後14週6日までに行う		
	生後3ヵ月	○四種混合 （ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ）	計4回			
		Ⅰ期初回	3回 （20～56日までの間隔内で）	生後3ヵ月～12ヵ月未満	不活化ワクチン	訪問
		Ⅰ期追加	1回 （3回目の接種後12～18ヵ月の間隔内で）	90ヵ月未満まで		
	生後5ヵ月	○ＢＣＧ	計1回	生後5～8ヵ月	生ワクチン	訪問
	生後6ヵ月	○日本脳炎	計4回			
		Ⅰ期初回	2回 （6～28日間隔内で）		不活化ワクチン	4か月健診時
		Ⅰ期追加	1回 （初回接種後おおむね1年後）			
		Ⅱ期	1回	9～10歳未満		通知
	生後1歳	○麻疹風疹（ＭＲ）	計2回			
		Ⅰ期	1回	生後12ヵ月～24ヵ月未満	生ワクチン	10か月健診時
		Ⅱ期	1回	年長児（小学校就学前の1年間）		通知
		○水痘（みずぼうそう）	計2回			
			1回目の接種後、6～12ヵ月の間隔内で2回目を接種する。	生後12ヵ月～36ヵ月未満まで	生ワクチン	10か月健診時
	11歳	○二種混合 （ジフテリア・破傷風）	計1回	11～12歳未満	不活化ワクチン	通知
任意	主な任意の予防接種		接種の有無については保護者の判断になります。自費となりますので、費用等は医療機関にお問い合わせください。			
		○おたふくかぜ			生ワクチン	

（※1）小児肺炎球菌とヒブワクチンは、生後7ヵ月以降から接種を開始する場合は、接種回数が違ってきます。

（※2）ロタウイルスワクチンは、ワクチンの種類が2種類あります。ワクチンによって接種回数が異なります。

◆定期接種の場合、対象年齢を過ぎると任意接種となり、接種費用がかかってきますので注意してください。

◆上記の欄には標準的な接種期間（病気にかかりやすい時期を考慮して接種が勧められる時期）を記しています。対象年齢とは異なりますので注意してください。